

Nome e cognome _____ Data di compilazione ____/____/____

IIEF - International Index of Erectile Function

Il seguente questionario è composto da cinque domande per valutare in modo semplice e specifico la funzione erettile del paziente. Il paziente deve cercare di rispondere il più onestamente e chiaramente possibile per poter valutare correttamente una eventuale disfunzione erettile. Ogni domanda ha cinque possibili risposte, segnate da punteggi da 0 fino a 5. Cerciare una sola risposta e calcolare il punteggio complessivo.

In caso di assenza di rapporti sessuali nelle ultime 4 settimane legata alla malattia in atto o a motivi circostanziali, prendere in considerazione un periodo più ampio (6 mesi). In caso di assenza di attività, cercare lo 0.

1 - Nelle ultime 4 settimane quanto spesso è stato in grado di avere un'erezione durante l'attività sessuale?

- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai
- [0] non ho avuto alcuna attività sessuale

2 - Nelle ultime 4 settimane quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione sessuale, quanto spesso queste erano tali da permettere la penetrazione?

- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai
- [0] non ho avuto alcuna attività sessuale

3 - Nelle ultime 4 settimane, quando ha tentato di avere un rapporto sessuale, quanto spesso è stato in grado di penetrare la Sua partner?

- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai
- [0] non ho tentato di avere rapporti sessuali

Prof Rocco Damiano (OdMCeO CE4590)

PROF ROCCO DAMIANO
ORDINARIO DI UROLOGIA
UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA CATANZARO
SPECIALISTA IN UROLOGIA

4 - Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale, quanto spesso è stato in grado di mantenere l'erezione dopo aver penetrato la partner?

- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai
- [0] non ho tentato di avere rapporti sessuali

5 - Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale, quanto difficile è stato mantenere l'erezione fino al completamento del rapporto?

- [5] estremamente difficile
- [4] molto difficile
- [3] difficile
- [2] poco difficile
- [1] per niente difficile
- [0] non ho tentato di avere rapporti sessuali

Il vostro punteggio totale=

da 5 a 8 disfunzione erettile severa
da 8 a 11 disfunzione erettile moderata
da 12 a 16 disfunzione erettile da lieve a moderata
da 17 a 21 disfunzione erettile lieve
da 22 a 25 assenza di disfunzione erettile

Prof Rocco Damiano (OdMCeO CE4590)